

2018

MATHEMATICS

(General)

(Abstract Algebra and Matrices)

Full Marks : 60

Time : 3 hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions*

Answer either in English or in Assamese

PART—I

(Marks : 7)

1. Answer the following questions : $1 \times 7 = 7$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Find the order of i and $-i$ in the multiplicative group $G = \{1, -1, i, -i\}$, where $i = \sqrt{-1}$.

গুণাধিনৰ সংঘ $G = \{1, -1, i, -i\}$ ত i আৰু $-i$ ৰ মৌলাংক নিৰ্ণয় কৰা, য'ত $i = \sqrt{-1}$.

(b) What is the order of the permutation group A_n the alternating group?

বিন্যাস সংঘ A_n (alternating group)ৰ মাত্রা কিমান ?

(2)

(c) Cyclic groups are abelian. Is it true?

চক্রীয় সংগ্রহোৰ এবেলীয়। ই সত্যনে ?

(d) Give an example of a commutative ring without unity.

এটা একক মৌলিকভাবে ক্রমবিনিমেয় বলয়ৰ উদাহৰণ দিয়া।

(e) Define a homomorphism from a group to another group.

এটা সংগ্রহ পৰা আন এটা সংগ্রলৈ অনুকূপতাৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(f) Can the following two matrices be added? Justify your answer.

তলৰ মৌলকক্ষ দুটা যোগ কৰিব পাৰিবে ? তোমাৰ উত্তৰৰ যুক্তিস্থূতা দিয়া।

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 9 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 7 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

(g) If A is a symmetric matrix, then show that kA is also symmetric, where k is a scalar.

যদি A এটা সমমিত মৌলকক্ষ হয়, তেন্তে দেখুওৱা যে kA ও সমমিত, য'ত k এটা অদিশ বাণি।

(3)

PART-II

(Marks : 8)

2. Answer the following questions : 2×4=8

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Give an example to show that the union of two subgroups is not a subgroup.

এটা উদাহৰণৰ সহায়ত দেখুওৱা যে দুটা উপসংঘৰ মিলন আন এটা উপসংঘ নহয়।

- (b) Define cyclic group and give an example of it.

চক্ৰীয় সংঘৰ সংজ্ঞা দিয়া আৰু ইয়াৰ এটা উদাহৰণ দিয়া।

- (c) Find the order of the following permutation :

তলৰ বিন্যাসটোৰ মাত্ৰা উলিওৱা :

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 7 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

- (d) If $f : G \rightarrow G'$ is a homomorphism, then show that $f(e) = e'$, where e and e' are the identities of G and G' respectively.

যদি $f : G \rightarrow G'$ এটা অনুকূলপতা হয়, তেন্তে দেখুওৱা যে $f(e) = e'$, য'ত e আৰু e' ক্রমে G আৰু G' ৰ একক মৌল।

(4)

PART—III

(Marks : 15)

3. Answer any *three* of the following questions :

$5 \times 3 = 15$

তলত দিয়া প্রশ্নবোৰ যি কোনো তিনিটাৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Define group. Prove that in a group G

- (i) $(a^{-1})^{-1} = a$, $\forall a \in G$, where a^{-1} stands for inverse of a ;
(ii) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, $\forall a, b \in G$.

সংঘৰ সংজ্ঞা দিয়া। এটা সংঘ G ত প্ৰমাণ কৰা যে

- (i) $(a^{-1})^{-1} = a$, $\forall a \in G$, য'ত a^{-1} হ'ল a ৰ
প্ৰতিলোম;
(ii) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, $\forall a, b \in G$.

(b) Define centre of a group. Prove that
centre of a group G is a subgroup of G .

$1+4=5$

এটা সংঘৰ কেন্দ্ৰৰ সংজ্ঞা দিয়া। এটা সংঘ G ৰ কেন্দ্ৰ
উপসংঘ বুলি প্ৰমাণ কৰা।

(c) Define the following :

তলত দিয়াবোৰৰ সংজ্ঞা দিয়া :

(i) A commutative ring

এটা ক্ৰমবিনিময় বলয়

(ii) A ring with unity

এটা একক-যুক্ত বলয়

(5)

(iii) A ring with zero divisors

এটা শূন্য-ভাজক বলয়

(iv) An integral domain

এটা পূর্ণাংকীয় বাস্তু

(v) A field

এটা ক্ষেত্র

(d) Define orthogonal matrix. Prove that—

(i) an orthogonal matrix is non-singular;

(ii) the inverse of an orthogonal matrix is orthogonal.

লাইনিংক মৌলকক্ষ সংজ্ঞা দিয়া। প্রমাণ কৰা যে—

(i) এটা লাইনিংক মৌলকক্ষ অঙ্কীয়মান;

(ii) এটা লাইনিংক মৌলকক্ষ প্রতিলোম এটা লাইনিংক মৌলকক্ষ।

(e) Find the inverse of the following matrix :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

তলৰ মৌলকক্ষটোৱ বিপৰীত মৌলকক্ষ নিৰ্গত কৰা :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(6)

PART—IV

(Marks : 30)

Answer either (a) and (b) or (c) and (d) from each
of the following questions : $10 \times 3 = 30$

তলত দিয়া প্রশ্নসমূহের পরা (a) আৰু (b) অথবা (c) আৰু (d) বা উভয়
দিয়া :

4. (a) Show that a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G , if and only if $ab^{-1} \in H$, $\forall a, b \in H$. 5

দেখুওৱা যে G সংঘৰ অৰিজ্ঞ উপসংহতি H , G ৰ
এটা উপসংঘ হ'ব, যদি আৰু যদিহে
 $ab^{-1} \in H$, $\forall a, b \in H$.

- (b) Prove that a subgroup H of a group G is a normal subgroup of G , if and only if $xHx^{-1} = H$, $\forall x \in G$. 5

প্ৰমাণ কৰা যে এটা সংঘ G ৰ উপসংঘ H নিষ্পৰ
উপসংঘ হ'ব, যদি আৰু যদিহে
 $xHx^{-1} = H$, $\forall x \in G$.

- (c) If H is a subgroup of the group G , then aH and bH are two cosets, then either $aH = bH$ or $aH \cap bH = \emptyset$. 5

যদি H , G সংঘৰ এটা উপসংঘ, তেন্তে aH আৰু bH
সহসংহতি দুটা হয় সমান, নহয় সিহঁতৰ অসংযুক্ত অৰ্থাৎ
 $aH = bH$ বা $aH \cap bH = \emptyset$.

- (d) Define Kernel of a homomorphism $\phi: G \rightarrow G'$, where G and G' are two groups. Prove that Kernel of ϕ is a normal subgroup of G . 1+4=5

G আৰু G' দুটা সংষ্ব হ'লে $\phi: G \rightarrow G'$ অনুকূপতাৰ মূল্যাংশৰ সংজ্ঞা দিয়া। প্ৰমাণ কৰা যে ϕ ৰ মূল্যাংশ G সংষ্ব নিষ্পৰ উপসংষ্ব।

5. (a) Prove that a ring R is commutative, if and only if $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $\forall a, b \in R$. 4
 প্ৰমাণ কৰা যে R এটা ক্ৰমবিনিমেয় বলয় হ'ব, যদি আৰু
 যদিহে $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $\forall a, b \in R$.

- (b) In any ring R , prove that
 যি কোনো এটা বলয় R ত, প্ৰমাণ কৰা যে
 (i) $a0 = 0 = 0a$, $\forall a \in R$
 (ii) $a(-b) = (-a)b = -ab$, $\forall a, b \in R$
 (iii) $(b-c) \cdot a = b \cdot a - c \cdot a$, $\forall a, b, c \in R$
2+2+2=6

- (c) Prove that every field is an integral domain. Is the converse true? Justify your answer. 3+1+1=5
 প্ৰমাণ কৰা যে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰই এটা পূৰ্ণাংকীয় বাট্ট।
 ইয়াৰ বিপৰীতটো সত্যনে? তোমাৰ উত্তৰ যুক্তিশুভতা
 প্ৰতিপন্ন কৰা।

- (d) Prove that a ring R is without zero divisors, if and only if cancellation laws hold in it. 5
 এটা বলয় R অশূন্য ভাজক হ'ব, যদি আৰু যদিহে বলয় R ত cancellation law সিদ্ধ হয়।

(8)

6. (a) For the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

verify that $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = |A| I_3$.

6

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ মৌলকক্ষটোর বাবে সত্যাপন}$$

করা। যে $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = |A| I_3$.

(b) If A is non-singular matrix, then show
that $\text{adj} \cdot \text{adj } A = |A|^{n-2} \cdot A$.

4

যদি A এটা অক্ষীয়মান মৌলকক্ষ হয়, তেন্তে দেখুওৱা যে
 $\text{adj} \cdot \text{adj } A = |A|^{n-2} \cdot A$.

(c) Define the rank of a matrix. Find the
rank of the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

2+3=5

এটা মৌলকক্ষ ক্ষেত্রিক সংজ্ঞা দিয়া। মৌলকক্ষ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & -2 & 3 \end{pmatrix} \text{ কোটি নির্ণয় করা।}$$

(d) Solve by matrix method :

5

মৌলকক্ষ পদ্ধতিব সহায়তে সমাধান করা :

$$x + y + z = 4$$

$$2x - y + 3z = 1$$

$$3x + 2y - z = 1$$

* * *